



$$\cos \frac{2\pi}{5}$$



*Les marges sont les lieux les plus proches de sens*

« Les hommes d'habitude, voient les choses telles qu'elles sont et disent "pourquoi ?". Je rêve de choses qui ne sont pas et je demande "pourquoi pas ?" »

BERNARD SHAW

J'ai essayé de traduire l'exercice ci-dessous, mais ma meilleure rédaction est loin de me satisfaire. Si le lecteur a une idée d'une traduction adéquate, je lui serais reconnaissant de me la faire parvenir, par mon e-mail habituel :

E-mail  : [Theo.Heikay@Math-Univ-Provence.eu](mailto:Theo.Heikay@Math-Univ-Provence.eu)

Soit  $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ , continue, ouverte, surjective. Montrons que  $f(0) \in \{0, 1\}$ . Montrons que  $Z = f^{-1}(1)$  est fermé non vide de cardinal fini.

Il m'a d'abord paru utile de justifier que les *maxima locaux* valent 1 et les *minima locaux* valent 0.

Supposons qu'en  $a$   $f$  atteigne un maximum local avec  $f(a) < 1$ . Il existe  $\alpha > 0$  tel que  $\forall x \in ]a - \alpha, a + \alpha[ \cap [0, 1] = I, f(x) \leq f(a)$ .

Mais  $I$  est un intervalle ouvert de  $[0,1]$ , donc  $f$  étant continue  $f(I)$  est un intervalle, (car connexe) et  $f$  étant ouverte,  $f(I)$  est un ouvert de  $[0,1]$ , or il est du type  $( , f(a) ]$  avec  $f(a) < 1$  : ce n'est pas un intervalle ouvert de  $[0,1]$ . C'est absurde, d'où  $f(a) = 1$ , (et de même un minimum local vaut 0).

Si alors  $f(0) = u \in ]0, 1[$ , ce n'est ni un maximum local ni un minimum local,





With Théo Héikay

$$\cos \frac{2\pi}{5}$$



donc  $\forall \alpha > 0, \exists x_1, x_2$  dans  $]0, \alpha[$  tels que  $f(x_1) < u = f(0) < f(x_2)$ . En particulier, ( $f$  continue en 0 et  $f(0) \in ]0, 1[$ ) ceci est vrai pour  $\alpha$  assez petit pour que  $f([0, \alpha]) \subset ]0, 1[$ .

Puis, il existe  $x_3$  entre  $x_1$  et  $x_2$  tel que  $f(x_3) = u$ , (théorème des valeurs intermédiaires).

Supposons  $0 < x_1 < x_3 < x_2$ : sur  $[0, x_3]$   $f$  prend la valeur  $f(x_1) < f(0) = f(x_3)$ , donc  $f$  admet un minimum absolu, (continue sur un compact) donc relatif, atteint, et comme  $f([0, \alpha]) \subset ]0, 1[$ , ce minimum local n'est pas 0. L'hypothèse  $0 < x_2 < x_3 < x_1$  conduit à l'existence, sur  $[0, x_3]$ , de valeurs ( $f(x_2)) > f(0) = f(x_3)$ , donc a un maximum local de  $f$  qui n'est pas 1. On aboutit à une absurdité donc  $f(0) \in \{0, 1\}$ .

Puis  $Z = f^{-1}(1)$  est fermé, ( $f$  est continue), non vide, ( $f$  est surjective fini. Sinon il existerait un point d'accumulation  $a$  dans  $Z$ , donc une suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  strictement monotone d'éléments de  $Z$ , qui convergerait vers  $a$ . Sur le segment d'extrémités  $x_n$  et  $x_{n+1}$ ,  $f$ , continue, admet un minimum, qui est un minima local, donc qui vaut 0, et qui est atteint en  $y_n$ . D'où une suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de points qui converge vers  $a$ , avec  $f(y_n) = 0$ . Par continuité, on aurait  $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$  et  $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 0$ . Absurde. Donc

$Z$  est fini.

*Quod erat demonstrandum*, comme aiment à le dire les latinistes.





$$\cos \frac{2\pi}{5}$$



*La même suite peut-elle avoir des limites différentes pour des normes différentes ?*

« *Votre cervelle, docteur, est un bouillon de culture pour points d'interrogation !... »*

PAUL VALÉRY

Je vais essayer de répondre à ce carrefour, à une question en général non posée, du moins si j'en juge par mon passé d'étudiant : *la même suite peut-elle avoir des limites différentes pour des normes différentes ?* Honnêtement, on répond plutôt non... En soumettant à la sagacité de mes étudiants cette question (ce mercredi 12 mars 08), je n'ai pas été déçu qu'ils aient avancé une réponse univoque. Eh bien non, c'est oui. Mais peut-on le prouver en s'appuyant sur des exemples ? Ce n'est pas par masochisme que j'ai tenu à rédiger une justification à ce non dit, mais par ce que je pense être de l'honnêteté intellectuelle. Il me semble que l'intérêt de la formation mathématique est de former des individus qui ne « s'en laissent pas conter », qui ne se contentent pas d'affirmations non justifiées. J'ai donc préféré rédiger ces lignes rébarbatives, quitte à ce qu'elles ne soient pas lues.

Soit en effet  $E = \mathbb{R}[X]$ ,  $A$  une partie bornée, de cardinal infini de  $\mathbb{R}$ , on définit une norme  $N_A$  sur  $E$  par :  $N_A(P) = \sup \{ |P(x)|, x \in A \}$ .





$$\cos \frac{2\pi}{5}$$



C'est une norme car  $A \subset \overline{A}$  fermé borné donc compact, et  $N_A(P) = N_{\underline{A}}(P)$  d'ailleurs

car  $P$  est continue, existe. Si c'est nul, le polynôme  $P$  est nul, (infinité de zéros), et on vérifie facilement qu'il s'agit d'une norme.

Soit alors les polynômes  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  que je viens de construire, et les deux polynômes  $Q(x) = x$  et  $-Q = R$ .

Si  $A = [-1, 0]$ , comme alors  $|t| = -t = R(t)$ , on a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall t \in [-1, 0], |R(t) - P_n(t)| \leq \varepsilon$$

soit  $N_A(R - P_n) \leq \varepsilon$  pour  $n \geq n_0$  : la suite des  $P_n$  converge vers  $R$  pour la norme  $N_A$ .

Par contre (les linguistes diront : en revanche ! n'est-ce pas...), avec  $B = [0, 1]$ , pour

$$t \in [0, 1], |t| = t = Q(t), \text{ et cette fois on aura } \lim_{n \rightarrow +\infty} N_B(Q - P_n) = 0.$$

Donc cette suite admet deux limites différentes pour deux normes différentes.

**Moralité** \_ En dimension infinie, il y a en général non équivalence des normes, ce qui fait que la même suite peut avoir des limites différentes pour des normes différentes.



# Applied Mathematics



With Théo Héikay

$$\cos \frac{2\pi}{5}$$

Opération DOCTEUR X WANTED



## Autre exemple

Soit  $Q$  un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$ . Construire une norme sur  $\mathbb{R}[X]$  telle que la suite  $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $Q$  pour cette norme.



Applied Mathematics Center

*It is worth remembering, if only for the sense of calm that it provides, that we belong to those who reject darkness*

$$e^{\pi} \sqrt{163}$$

Teacher and Researcher  
5/6





$$\cos \frac{2\pi}{5}$$



Ma solution

On se donne le polynôme  $Q = \sum_{k=0}^q a_k X^k$ , avec  $q$ , degré de  $Q$  si  $Q$  est non nul, et sinon,

$q$  entier laissé à votre choix.

En posant  $e_i = X^i$  pour  $i \leq q$  et  $e_i = X^i - Q$  si  $i > q$  la famille des  $(e_i)_{i \in \mathbb{N}}$  est une famille de polynômes de  $\mathbb{R}[X]$  de degrés échelonnés, donc c'est une base de  $E = \mathbb{R}[X]$ , et, en posant pour  $P = \sum_{i \in \mathbb{N}} \alpha_i e_i$ , (les  $\alpha_i$  étant presque tous nuls),

$\|P\| = \sup \left\{ \frac{1}{2^i} |\alpha_i|, i \in \mathbb{N} \right\}$ , ce sup existe, (famille finie de nombres positifs), et il est immédiat de vérifier que c'est une norme.

De plus comme pour tout  $n > q$  on a  $X^n - Q = e_n$ , on a  $\|X^n - Q\| = \frac{1}{2^n} \times 1$ , donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \|X^n - Q\| = 0.$$

Pour cette norme, la suite  $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $Q$  et on peut choisir  $Q$  au départ quelconque, donc la même suite peut avoir des limites différentes pour des normes non équivalentes.

